

108 年度民專上字第 38 號附圖


附圖一： KMD-3213



附圖二：系爭專利請求項化合物



附圖三： 系爭藥品之結構式





附圖四： 上訴人藥品與系爭藥品外觀比對照片

「優列扶」4 毫克膠囊	「迅攝康」4 毫克膠囊
外觀比較（正面）（遠觀） 	外觀比較（正面）（遠觀） 
外觀比較（正面）（近觀） 	外觀比較（正面）（近觀） 

「優列扶」4 毫克膠囊	「迅攝康」4 毫克膠囊
外觀比較（背面）	外觀比較（背面）
	

附表一：系爭專利請求項 1 之技術特徵比對表

系爭膠囊專利			系爭藥品	文義讀取		均等適用	
請求項	要件編號	技術特徵	技術內容	要件比對	結論	要件比對	結論
1	1A	一種膠囊，	『迅攝康膠囊 4 毫克』為一種藥學膠囊劑型	是	否		否
	1B	係為含有(1)含有 a)作為活性成分之以下式  表示之化合物、 b)D-甘露糖醇及 c)**部分α化澱粉**之混合物進行濕式造粒所得的造粒物、與 (2) d)選自硬脂酸鎂、硬脂酸鈣及滑石之潤滑劑及 e)硫酸月桂酯鈉而成者	迅攝康膠囊含有下列結構式的活性成分：  以及**低取代度羥丙基纖維素**、甘露糖醇、羥丙基纖維素-L、硫酸月桂酯鈉、滑石、硬酯酸鎂、純水、明膠、二氧化鈦、硫酸月桂酯鈉、純水等賦形劑	否		否	
	1C	其特徵為依日本藥典溶離試驗法第 2 法(槳式攪拌法，Paddle 法)，在以水為試驗液、旋轉數為每分鐘 50 轉之溶離試驗中，其 85%溶離時間為 60 分鐘以下	迅攝康膠囊於對應條件下，60 分鐘的溶離度已達 100%	是			